TD 31 : INTÉGRATION

► Fonctions uniformément continues, fonctions en escalier, continues par morceaux

EXERCICE 31.1 Prouver que la fonction $\ln$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbf{R}_+^*$. L'est-elle sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$, $a > 0$?

PD

EXERCICE 31.2 Soit $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ uniformément continue. Prouver que si $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (la première limite étant une limite de suite, la seconde étant une limite de fonction).
Ce résultat est-il encore vrai si on remplace uniformément continue par continue ?

AD

EXERCICE 31.3 Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b])$ positive sauf en un nombre fini de points.
Prouver que pour $x \in [a, b]$, si $f(x) < 0$, alors x appartient à toute subdivision adaptée à f .

PD

EXERCICE 31.4 Montrer que $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbf{R}) = \mathcal{C}([a, b], \mathbf{R}) + \mathcal{E}([a, b], \mathbf{R})$ (le + désignant la somme de sous-espaces vectoriels).

AD

► Propriétés de l'intégrale, calculs

EXERCICE 31.5 Un peu de subtilité dans les inégalités

PD

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx$.

EXERCICE 31.6 Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbf{C})$. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 t^n f(t) dt$.

PD

EXERCICE 31.7 Déterminer un équivalent, lorsque $x \rightarrow +\infty$, de $\int_0^x \lfloor t \rfloor dt$.

PD

EXERCICE 31.8 Cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire.

PD

Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbf{R})$. Prouver que $\left| \int_a^b f(t) dt \right| = \int_a^b |f(t)| dt$ si et seulement si f est de signe constant sur $[a, b]$.

EXERCICE 31.9 Donner un équivalent lorsque $x \rightarrow +\infty$ de $\int_0^x |\sin t| dt$.

PD

EXERCICE 31.10 Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$, et telle que $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$.

PD

Montrer que f possède un point fixe.

EXERCICE 31.11 Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbf{R})$. Montrer que $g : x \mapsto \int_a^b f(t) \sin(xt) dt$ est lipschitzienne sur $\mathbf{R}$.

PD

EXERCICE 31.12 Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbf{R})$, à valeurs positives. Prouver que

AD

$$\|f\|_\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{\frac{1}{n}}.$$

EXERCICE 31.13 Première formule de la moyenne

AD

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$, à valeurs dans $\mathbf{R}$, avec g positive.

Prouver qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f(t)g(t) dt = f(c) \int_a^b g(t) dt$.

EXERCICE 31.14 Majoration de l'erreur dans la méthode du point milieu

AD

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a, b]$. On pose $c = \frac{a+b}{2}$.

On pose $\varphi : x \mapsto f(c) + (x-c)f'(c)$. Peut-être aurez-vous reconnu l'équation de la tangente à f au point d'abscisse c ?

On note F une primitive de $f - \varphi$ sur $[a, b]$.

1. Montrer que $\forall x \in [a, b]$, $F(x) = F(c) + \int_c^x \frac{(x-t)^2}{2} f''(t) dt$.

2. Prouver alors que $\left| \int_a^b f(t) dt - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24} \|f''\|_\infty$.

3. En déduire une majoration de l'erreur dans la méthode du point milieu.

EXERCICE 31.15 Lemme de Riemann-Lebesgue

Soit f une fonction continue par morceaux sur un segment $[a, b]$. On souhaite prouver que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \cos(nt) dt = 0$.

- Commencer par traiter le cas où f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$.
- Traiter le cas d'une fonction en escaliers.
- Traiter le cas général à l'aide du théorème d'approximation.

EXERCICE 31.16 Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbf{R})$.

1. On suppose que $\int_a^b f(t) dt = 0$. Prouver que f s'annule au moins une fois sur $[a, b]$.

2. On considère à présent $n \in \mathbf{N}$, et on suppose que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \int_a^b t^k f(t) dt = 0$.

Montrer par l'absurde que f s'annule au moins $n + 1$ fois sur $[a, b]$. On pourra notamment considérer des intégrales de la forme $\int_a^b f(t)Q(t) dt$ où Q est un polynôme de $\mathbf{R}_n[X]$ bien choisi.

► Fonctions définies par des intégrales

EXERCICE 31.17 Soit f continue sur $\mathbf{R}$. Montrer que la fonction $g : x \mapsto \int_{2x}^{x^2} f(t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}$ et donner sa dérivée.

Même question pour $h : x \mapsto \int_0^x f(t+x) dt$.

EXERCICE 31.18 Soit f continue sur $\mathbf{R}$ et g définie sur $\mathbf{R}$ par $g(x) = f(x) \int_0^x f(t) dt$.

Montrer que si g est décroissante sur $\mathbf{R}$, alors f est nulle.

EXERCICE 31.19 Soit f continue sur $] -1, 1[$ à valeurs réelles. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x t f(t) dt$.

EXERCICE 31.20 Un peu d'algèbre linéaire

Pour tout $f \in \mathcal{C}^0(\mathbf{R})$, on définit une fonction $T(f)$ par $\forall x \in \mathbf{R}, T(f)(x) = x \int_0^x f(t) dt$.

- Prouver que $T : f \mapsto T(f)$ est un endomorphisme de $\mathcal{C}^0(\mathbf{R})$.
- Est-ce que T est injectif ? Surjectif ?

EXERCICE 31.21 Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ continue. On définit $F : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ par $F(x) = \int_0^1 \min(x, t) f(t) dt$.

- Prouver que F est de classe $\mathcal{C}^2$ et calculer sa dérivée seconde.
- En déduire que $\forall x \in [0, 1], F(x) = \int_0^x \left(\int_u^1 f(t) dt \right) du$.

EXERCICE 31.22 Une intégrale à paramètre

Pour $x \geq 0$, on pose $F(x) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{x + \cos t} dt$. Dans la suite, on fixe $x_0 > 0$.

1. Prouver que pour tout $t \in [0, \frac{\pi}{2}], \forall h \in \left[\frac{1-x_0}{2}, \frac{x_0-1}{2} \right]$,

$$\left| \sqrt{x_0 + h + \cos t} - \sqrt{x_0 + \cos t} - \frac{h}{2\sqrt{x_0 + \cos t}} \right| \leq \frac{h^2}{2\sqrt{2}} \frac{1}{(\sqrt{1+x_0+2\cos t})^3}.$$

2. En déduire que F est dérivable sur $]1, +\infty[$, et que

$$\forall x \in]1, +\infty[, F'(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{2\sqrt{x + \cos t}}.$$

► Formules de Taylor

EXERCICE 31.23 Montrer que pour tout $x \in [0, \pi]$, $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$.

F

EXERCICE 31.24 Un grand classique

PD

Prouver que pour tout $x \in \mathbf{R}$, $|e^x - 1 - x| \leq \frac{x^2}{2} e^{|x|}$.

EXERCICE 31.25 Prouver que pour tout $x \in \mathbf{R}$, $\cos x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$.

PD

EXERCICE 31.26 Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}$, telle que $\forall n \in \mathbf{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$. On suppose de plus qu'il existe $A > 0$ tel que $\forall n \in \mathbf{N}$, $\sup_{\mathbf{R}} |f^{(n)}| \leq A^n n!$.

AD

Prouver que f est nulle sur $\left] -\frac{1}{A}, \frac{1}{A} \right]$, puis qu'elle est nulle sur $\mathbf{R}$.

EXERCICE 31.27 Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$. Pour $n \geq 1$, on pose

AD

$$u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \right).$$

Montrer que (u_n) converge vers $\exp\left(\int_0^1 f(t) dt\right)$.

► Sommes de Riemann

EXERCICE 31.28 Déterminer les limites des suites suivantes :

PD

1. $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2}$

3. $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \left(e^{k+n} \right)^{\frac{1}{n}}$

2. $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \cos^2\left(\frac{k\pi}{n}\right)$

4. $u_n = \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}$.

EXERCICE 31.29 Donner un équivalent de $u_n = \sqrt{1}\sqrt{n-1} + \sqrt{2}\sqrt{n-2} + \cdots + \sqrt{n-2}\sqrt{2} + \sqrt{n-1}\sqrt{1}$.

AD

EXERCICE 31.30 Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par $u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right)$.

PD

EXERCICE 31.31 Déterminer un équivalent simple de $S_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$.

AD

EXERCICE 31.32 Déterminer la limite lorsque $n \rightarrow +\infty$ de $u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}$.

PD

(★) Retrouver alors la limite de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

EXERCICE 31.33 Intégrale de Poisson

D

Déterminer les valeurs de a pour lesquelles $\int_0^\pi \ln(a^2 - 2a \cos(x) + 1) dx$ est bien définie, et calculer la valeur de cette intégrale en utilisant des sommes de Riemann.

EXERCICE 31.34 (Oral X)

D

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, à valeurs strictement positives, et soit $n \in \mathbf{N}^*$.

1. Montrer qu'il existe une unique subdivision $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ de $[a, b]$ telle que $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$,

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt = \frac{1}{n} \int_a^b f(t) dt.$$

2. Déterminer alors la limite, lorsque $n \rightarrow +\infty$, de $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k)$.

CORRECTION DES EXERCICES DU TD 31

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.1

Soit $\varepsilon > 0$, et soit $x_0 \in \mathbf{R}_+^*$.

Cherchons pour quelles valeurs de $h \geq 0$ on a $|\ln(x_0 + h) - \ln(x_0)| \leq \varepsilon$.

Pour $h \geq 0$, on a, par croissance de $\ln$, $|\ln(x_0 + h) - \ln(x_0)| = \left| \ln\left(\frac{x_0 + h}{x_0}\right) \right| = \ln\left(\frac{x_0 + h}{x_0}\right)$.

Et donc

$$\begin{aligned} |\ln(x_0 + h) - \ln(x_0)| \leq \varepsilon &\Leftrightarrow \ln\left(1 + \frac{h}{x_0}\right) \leq \varepsilon \\ &\Leftrightarrow 1 + \frac{h}{x_0} \leq e^\varepsilon \\ &\Leftrightarrow h \leq x_0(e^\varepsilon - 1). \end{aligned}$$

Supposons par l'absurde que $\ln$ soit uniformément continue sur $\mathbf{R}_+^*$, et prenons donc $\varepsilon = \ln(2)$, de sorte que $e^\varepsilon - 1 = 1$.

Soit alors η tel que $\forall x, y \in \mathbf{R}_+^*, |x - y| \leq \eta \Rightarrow |\ln(x) - \ln(y)| \leq \ln(2)$. Prenons alors $x_0 = \frac{\eta}{2}$. Par le calcul conduit précédemment, avec $h = \eta$, on n'a pas $h \leq x_0$, donc $|\ln(x_0 + h) - \ln(x_0)| > \varepsilon$.

Mais dans le même temps, $|(x_0 + h) - x_0| \leq \eta$, si bien que $|\ln(x_0 + h) - \ln(x_0)| \leq \varepsilon$. D'où une contradiction, et donc la fonction $\ln$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbf{R}_+^*$.

Donnons un autre argument plus général : une fonction uniformément continue sur un intervalle **borné** doit y être bornée.

Ici, si $f = \ln$ était uniformément continue, alors il existerait $\eta > 0$ tel que $\forall (x, y) \in \mathbf{R}_+^*, |x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq 1$.

Alors, pour $x \in [1 - \eta, 1]$, $|f(x) - f(1)| \leq 1$.

Pour $x \in [1 - 2\eta, 1]$, $|f(x) - f(1)| \leq |f(x) - f(1 - \eta)| + |f(1 - \eta) - f(1)| \leq 2$.

Et on prouve ainsi que pour tout $k \in \mathbf{N}$ tel que $1 - k\eta > 0$, alors $\forall x \in \mathbf{R}_+^* \cap [1 - (k+1)\eta, 1 - k\eta]$, $|f(x) - f(1)| \leq k$.

En particulier, pour $k = \left\lceil \frac{1}{\eta} \right\rceil - 1$, c'est-à-dire si k est le plus petit entier tel que $1 - (k+1)\eta \leq 0$, alors $\forall x \in]0, 1]$, $|f(x) - f(1)| \leq k$.

Donc f serait bornée sur $]0, 1]$, ce qui n'est pas le cas puisque $\ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$.

En revanche, sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$, la fonction $\ln$ est uniformément continue.

En effet, elle est dérivable, de dérivée $x \mapsto \frac{1}{x}$, qui est donc bornée par $\frac{1}{a}$.

Et donc¹ f est $\frac{1}{a}$ -lipschitzienne, donc uniformément continue.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.2

Posons $\varepsilon = 1$. La fonction f étant uniformément continue, il existe $\eta > 0$ tel que pour $|x - y| \leq \eta$, $|f(x) - f(y)| \leq 1$.

Soit alors $k \in \mathbf{N}$ tel que $k\eta > 1$.

Pour $x \in \mathbf{R}$, notons alors $n = \lfloor x \rfloor$, $h = \frac{x - n}{k}$.

Alors on a

$$\begin{aligned} |f(n) - f(x)| &= |f(n) - f(n+h) + f(n+h) - f(n+2h) + \dots + f(n+(k-1)h) - f(x)| \\ &\leq \sum_{i=0}^{k-1} |f(n+ih) - f(n+(i+1)h)| \\ &\leq \sum_{i=0}^{k-1} 1 \leq k. \end{aligned}$$

Et en particulier, $f(x) \geq f(n) - k$.

À présent, soit $A \geq 0$. Alors il existe $n_0 \in \mathbf{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbf{N}, n \geq n_0 \Rightarrow f(n) \geq A + k.$$

Détails

On a ici choisi (arbitrairement) $\varepsilon = 1$ dans la définition de l'uniforme continuité.

Idée

La formulation est un peu désagréable juste pour ne pas se retrouver à parler du logarithme d'un nombre négatif. Mais l'idée est juste qu'on peut recouvrir $]0, 1]$ à l'aide d'un nombre fini d'intervalles de longueur η .

¹ C'est l'inégalité des accroissements finis.

Autrement dit

On peut recouvrir $[0, 1]$ à l'aide de k segments de longueur η .

On coupe $[n, x]$ en k segments de même longueur.

On a $h \leq \frac{1}{k} < \eta$.

Et alors, pour tout $x \geq n_0$, on aura $\lfloor x \rfloor \geq n_0$, et donc $f(x) \geq f(\lfloor x \rfloor) - k \geq A$.
On reconnaît bien là la définition de $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Le résultat est faux pour des fonctions qui seraient uniquement continues. Par exemple la fonction $x \mapsto x \cos(2\pi x)$ est telle que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $f(n) = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, mais pour tout $n \in \mathbf{N}$, $f\left(n + \frac{1}{2}\right) = 0$, si bien que la fonction f n'a pas de limite en $+\infty$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.3

Supposons par l'absurde qu'il existe une subdivision $\sigma : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ adaptée à f et $x \notin \sigma$ tel que $f(x) < 0$.

Notons alors $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que $x_k < x < x_{k+1}$.

Par continuité de f sur $]x_k, x_{k+1}[$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $t \in]x_k, x_{k+1}[\cap]x - \eta, x + \eta[$, $f(t) < 0$.

Ceci contredit alors le fait que f est positive sauf en un nombre fini de points.

Donc tout réel tel que $f(x) < 0$ appartient forcément à toute subdivision adaptée à f .

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.4

Puisque nous savons déjà que $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbf{R})$ contient les deux sous-espaces vectoriels $\mathcal{C}([a, b], \mathbf{R})$ et $\mathcal{E}([a, b], \mathbf{R})$, il s'agit de prouver que $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbf{R}) = \mathcal{C}([a, b], \mathbf{R}) + \mathcal{E}([a, b], \mathbf{R})$.

Autrement dit, il s'agit de prouver que toute fonction continue par morceaux est somme d'une fonction continue et d'une fonction en escalier.

Soit donc $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbf{R})$ une fonction continue par morceaux, et soit $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ une subdivision de $[a, b]$ adaptée à f .

Pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, notons f_k le prolongement par continuité² de $f|_{]x_k, x_{k+1}[}$ à $[x_k, x_{k+1}]$, qui est donc une fonction continue sur $[x_k, x_{k+1}]$.

On définit alors une fonction ψ sur $[a, b]$ de la manière suivante : pour $x \in [x_0, x_1]$, $\psi(x) = f_0(x)$.

Puis pour $x \in]x_1, x_2]$, $\psi(x) = f_1(x) - f_1(x_1) + f_0(x_1)$. Alors ψ est continue en x_1 , puisque $\lim_{x \rightarrow x_1^-} \psi(x) = \lim_{x \rightarrow x_1^-} f_0(x) = f_0(x_1) = \psi(x_1)$ et que

$$\lim_{x \rightarrow x_1^+} \psi(x) = f_1(x_1) - f_1(x_1) + f_0(x_1) = \psi(x_1).$$

Pour $x \in]x_2, x_3]$, on pose alors $\psi(x) = f_2(x) - f_2(x_2) + f_1(x_2) - f_1(x_1) + f_0(x_1)$.

Et ainsi de suite : sur chaque intervalle $]x_k, x_{k+1}]$, ψ est égale à f_k plus une constante, la constante étant choisie de manière à garantir la continuité de ψ en x_k .

Si vous voulez une formule générale, on a, pour tout $x \in]x_k, x_{k+1}]$,

$$\psi(x) = f_k(x) - f_k(x_k) + \sum_{i=1}^{k-1} (f_{i-1}(x_i) - f_i(x_i)).$$

Il est alors clair que ψ est continue sur $]x_k, x_{k+1}[$ car f_k l'est, et on a alors, pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$,

$$\lim_{x \rightarrow x_k^-} \psi(x) = f_{k-1}(x_k) - f_{k-1}(x_{k-1}) + \sum_{i=1}^{k-2} (f_{i-1}(x_i) - f_i(x_i)) = \sum_{i=1}^{k-1} (f_{i-1}(x_i) - f_i(x_i))$$

Remarque

Un tel point est donc un point de discontinuité de f .

Rappel

Si F et G sont deux sev de E , alors $F + G$ est le plus petit sev de E qui contient à la fois F et G .

² Rappelons que ce prolongement par continuité existe par définition même d'une fonction en escalier.

et

$$\lim_{x \rightarrow x_k^+} \psi(x) = f_k(x_k) - f_k(x_k) + \sum_{i=1}^{k-1} (f_{i-1}(x_i) - f_i(x_i))$$

Posons alors $\varphi = f - \psi$. Puisque sur chacun des $]x_k, x_{k+1}[$, ψ est égale à f plus une constante³, φ est constante sur $]x_k, x_{k+1}[$, et donc il s'agit bien d'une fonction en escaliers⁴

Ainsi, nous venons bien de prouver que $f = \psi + \varphi \in \mathcal{C}([a, b], \mathbf{R}) + \mathcal{E}([a, b], \mathbf{R})$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.5

Pour $x \in [0, 1]$, on a $\frac{x^n}{1+x^n} \leq x^n$, et donc par croissance de l'intégrale,

$$\int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

D'autre part, par positivité de l'intégrale, $\int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx \geq 0$.

Donc par le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx = 0$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.6

Puisque f est continue sur le segment $[0, 1]$, par le théorème des bornes atteintes elle y est bornée.

Soit donc $M > 0$ tel que pour tout $t \in [0, 1]$, $|f(t)| \leq M$.

Alors

$$\left| \int_0^1 t^n f(t) dt \right| \leq \int_0^1 |t^n f(t)| dt \leq \int_0^1 M t^n dt \leq \frac{M}{n+1}.$$

Et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 t^n f(t) dt = 0$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.7

Commençons par noter que par la relation de Chasles,

$$\int_0^x \lfloor t \rfloor dt = \int_0^{\lfloor x \rfloor} \lfloor t \rfloor dt + \int_{\lfloor x \rfloor}^x \lfloor t \rfloor dt.$$

Le calcul de la première intégrale est sans difficulté⁵ : pour $n \in \mathbf{N}$,

$$\begin{aligned} \int_0^n \lfloor t \rfloor dt &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} \lfloor t \rfloor dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} k dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \int_0^{\lfloor x \rfloor} \lfloor t \rfloor dt = \frac{\lfloor x \rfloor (\lfloor x \rfloor - 1)}{2}.$$

Notons que ceci équivaut, quand $x \rightarrow +\infty$ à $\frac{\lfloor x \rfloor^2}{2}$. Comme de plus il est classique⁶ que

$$x \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \lfloor x \rfloor, \text{ c'est donc équivalent à } \frac{x^2}{2}.$$

Par ailleurs, la seconde intégrale vérifie

$$0 \leq \int_{\lfloor x \rfloor}^x \lfloor t \rfloor dt \leq \int_{\lfloor x \rfloor}^x \lfloor x \rfloor dt \leq \underbrace{\lfloor x \rfloor (x - \lfloor x \rfloor)}_{\leq 1} \leq \lfloor x \rfloor \leq x.$$

³ Dépendant tout de même de k .

⁴ Et la subdivision qui était adaptée à f se trouve alors également adaptée à φ .

Remarque

On pourrait tout simplement prendre $M = \|f\|_\infty$, qui est le meilleur majorant possible de $|f|$.

⁵ Et s'interprète bien graphiquement.

⁶ Revenir à la définition de la partie entière pour le prouver.

Et donc en particulier, $\int_{[x]}^x \lfloor t \rfloor dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} O(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{x^2}{2}\right)$.

Et donc au final,

$$\int_0^x \lfloor t \rfloor dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x^2}{2}.$$

Alternative : plutôt que de calculer directement l'intégrale, on peut noter que pour tout $t \in \mathbf{R}$, $t - 1 < \lfloor t \rfloor \leq t$.

Et donc par croissance de l'intégrale,

$$\int_0^x (t - 1) dt \leq \int_0^x \lfloor t \rfloor dt \leq \int_0^x t dt$$

soit encore

$$\frac{x^2}{2} - x \leq \int_0^x \lfloor t \rfloor dt \leq \frac{x^2}{2}.$$

Et puisque $\frac{x^2}{2} - x \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x^2}{2}$, on a donc bien

$$\int_0^x \lfloor t \rfloor dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x^2}{2}.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.8

Vous aurez sans doute reconnu que ce résultat généralise le résultat sur le cas d'égalité⁷ dans l'inégalité triangulaire classique, l'intégrale étant à voir comme une sorte de somme infinie.

⁷ Lorsque tous les termes sont de même signe.

Si f est de signe constant, le résultat est évident.

Pour la réciproque, supposons $\left| \int_a^b f(t) dt \right| = \int_a^b |f(t)| dt$.

Supposons par exemple que $\int_a^b f(t) dt \geq 0$.

Alors $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b |f(t)| dt \Leftrightarrow \int_a^b (|f(t)| - f(t)) dt = 0$.

Mais la fonction $t \mapsto |f(t)| - f(t)$ est continue et positive sur $[a, b]$, donc son intégrale est nulle si et seulement si il s'agit de la fonction nulle. Soit si et seulement si $f = |f|$, ce qui est le cas si et seulement si f est positive.

On prouve de même que si $\int_a^b f(t) dt \leq 0$, alors $f = -|f|$ est négative.

Solution alternative : notons $f^+ = \frac{f + |f|}{2}$ et $f^- = \frac{|f| - f}{2}$, qui sont deux fonctions continues, à valeurs positives⁸, telles que $f = f^+ - f^-$ et $|f| = f^+ + f^-$.

⁸ Car $-|f| \leq f \leq |f|$.

On a alors, par croissance de l'intégrale, $\int_a^b f^+(t) dt \geq 0$ et $\int_a^b f^-(t) dt \geq 0$.

Si $\left| \int_a^b f(t) dt \right| = \int_a^b |f(t)| dt$, alors

$$\left| \int_a^b f^+(t) dt - \int_a^b f^-(t) dt \right| = \int_a^b f^+(t) dt + \int_a^b f^-(t) dt = \left| \int_a^b f^+(t) dt \right| + \left| \int_a^b f^-(t) dt \right|.$$

Et donc il y a égalité dans l'inégalité triangulaire, si bien que $\int_a^b f^+(t) dt$ et $-\int_a^b f^-(t) dt$ sont de même signe.

Ce n'est possible que si l'une des deux est nulle.

► Si $\int_a^b f^+(t) dt = 0$, alors puisqu'il s'agit d'une fonction continue de signe constant, c'est la fonction nulle, si bien que $f = -f^-$ est à valeurs négatives.

► Si $\int_a^b f^-(t) dt = 0$, alors pour les mêmes raisons, $f^- = 0$, donc $f = f^+$ est positive sur $[a, b]$.

Détails

On a déjà dit que $\int_{[a,b]} f^+$ et $\int_{[a,b]} f^-$ sont positives.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.9

Notons que la fonction $t \mapsto |\sin t|$ est π -périodique car $|\sin(x+\pi)| = |-\sin(x)| = |\sin(x)|$. Ainsi, pour tout $k \in \mathbf{N}$,

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin(t)| dt = \int_0^\pi |\sin t| dt = \int_0^\pi \sin t dt = 2.$$

FIGURE 31.1 – Toutes les «arches» ont la même aire.

Dans ce qui suit, l'idée est que $\int_0^x |\sin t| dt$ doit être environ égal à l'aire d'une arche, fois le nombre d'arches qui se trouvent entièrement entre 0 et x .

Soit donc $x \in \mathbf{R}$, et soit $k \in \mathbf{N}$ l'unique réel tel que $k\pi \leq x < (k+1)\pi$. Alors

$$\int_0^x |\sin t| dt = \sum_{i=0}^{k-1} \underbrace{\int_{i\pi}^{(i+1)\pi} |\sin t| dt}_{=2} + \int_{k\pi}^x |\sin t| dt = 2k + \int_{k\pi}^x |\sin t| dt.$$

Mais, par croissance de l'intégrale,

$$0 \leq \int_{k\pi}^x |\sin t| dt \leq \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t| dt \leq 2.$$

Et donc

$$2k \leq \int_0^x |\sin t| dt \leq 2k + 2.$$

Or, on a $\frac{x}{\pi} - 1 < k \leq \frac{x}{\pi}$, de sorte que

$$2\left(\frac{x}{\pi} - 1\right) \leq 2k \leq \int_0^x |\sin t| dt \leq 2k + 2 \leq 2\frac{x}{\pi} + 2.$$

En divisant par $\frac{2x}{\pi}$, il vient

$$1 - \frac{\pi}{x} \leq \frac{\pi}{2x} \int_0^x |\sin t| dt \leq 1 + \frac{\pi}{x}.$$

Par le théorème des gendarmes, on a donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2x} \int_0^x |\sin t| dt = 1$ et donc

$$\int_0^x |\sin t| dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2x}{\pi}.$$

Généralisation : ce résultat peut aisément se généraliser à toute fonction f qui soit continue et T -périodique, à condition que l'intégrale de f sur une période ne soit pas nulle⁹. On a alors

$$\int_0^x f(t) dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.10

La fonction $g : x \mapsto f(x) - x$ est continue sur $[0, 1]$. Si elle ne s'annule pas, c'est-à-dire si f n'a pas de point fixe, elle est donc de signe constant.

Et par conséquent, $\int_0^1 g(t) dt \neq 0$.

Mais $\int_0^1 g(t) dt = \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 t dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$, ce qui est absurde.

Donc g s'annule sur $[0, 1]$, si bien que f possède un¹⁰ point fixe.

Détails

Pour prouver la première égalité, on peut procéder au changement de variable $t = x - k\pi$.

Autrement dit

k est le nombre d'arches qui sont entièrement contenues entre les droites verticales d'abscisses 0 et x .

Remarque

Pour le dire autrement,

$$k = \left\lfloor \frac{x}{\pi} \right\rfloor.$$

⁹ Faut de quoi l'équivalent qui suit serait un équivalent à 0.

Rappel

L'intégrale d'une fonction de signe constant est nulle si et seulement si il s'agit de la fonction nulle.

¹⁰ Au moins un.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.11

Soit $(x, y) \in \mathbf{R}$. Alors

$$\begin{aligned} |g(x) - g(y)| &= \left| \int_a^b f(t) \sin(xt) dt - \int_a^b f(t) \sin(yt) dt \right| \\ &= \left| \int_a^b f(t) (\sin(xt) - \sin(yt)) dt \right| \\ &\leq \int_a^b |f(t) (\sin(xt) - \sin(yt))| dt \\ &\leq \int_a^b |f(t)| \cdot |\sin(xt) - \sin(yt)| dt \\ &\leq \int_a^b |f(t)| |xt - yt| dt \\ &\leq |x - y| \int_a^b |tf(t)| dt. \end{aligned}$$

Linéarité de l'intégrale.

Inégalité triangulaire.

Détails

La fonction $\sin$ est 1-lip-schitzienne. C'est une conséquence de l'inégalité des accroissements finis, puisque $|\sin'| \leq 1$.

Donc en notant $K = \int_a^b |tf(t)| dt$, qui est bien une constante indépendante de x et y , alors g est K -lipschitzienne sur $\mathbf{R}$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.12

Dans toute la suite, on note $M = \|f\|_\infty = \sup_{[a,b]} |f| = \sup_{[a,b]} f$. Notons que le cas $M = 0$

correspondant à la fonction nulle¹¹, on peut supposer que $M > 0$.

Puisque pour tout $t \in [a, b]$, $0 \leq f(t) \leq \|f\|_\infty$, alors par croissance de l'intégrale,

$$0 \leq \int_a^b f(t)^n dt \leq \int_a^b M^n dt \leq (b-a)M^n.$$

Et donc $0 \leq \left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{1/n} \leq M(b-a)^{1/n}$.

Puisque f est continue sur $[a, b]$, par le théorème des bornes atteintes, il existe $t_0 \in [a, b]$ tel que $f(t_0) = M$.

Et en particulier, pour $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $t \in [a, b]$,

$$|t - t_0| < \eta \Rightarrow |f(t)| \geq M - \varepsilon.$$

Notons alors $I = [a, b] \cap]t_0 - \eta, t_0 + \eta[$, et soit $\ell(I) > 0$ sa longueur¹².

On a alors

$$\int_a^b f(t)^n dt \geq \int_I f(t)^n dt \geq \int_I (M - \varepsilon)^n \geq \ell(I)(M - \varepsilon)^n.$$

Et donc $\left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{1/n} \geq \ell(I)^{1/n} (M - \varepsilon)$.

Puisque $\ell(I)^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, il existe $n_0 \in \mathbf{N}^*$ tel que pour $n \geq n_0$, $\ell(I)^{1/n} \geq \frac{M - 2\varepsilon}{M - \varepsilon}$.

Et donc pour $n \geq n_0$, $\left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{1/n} \geq M - 2\varepsilon$.

Sur le même principe, $(b-a)^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc il existe $n_1 \in \mathbf{N}^*$ tel que pour $n \geq n_1$,

$$(b-a)^{1/n} \leq \frac{M + 2\varepsilon}{M}.$$

Et donc pour $n \geq \max(n_0, n_1)$,

$$M - 2\varepsilon \leq \left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{1/n} \leq M + 2\varepsilon.$$

Et donc nous reconnaissons bien là la définition d'une limite :

$$\|f\|_\infty = \left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{1/n}.$$

¹¹ Pour laquelle le résultat est évidemment vrai, mais se passe de commentaires.

⚠ Attention !

À ce stade, l'existence de la limite de $\left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{1/n}$ n'est pas encore prouvée. Il n'est donc pas question de passer à la limite dans l'inégalité.

¹² Il s'agit encore bien d'un intervalle car intersection de deux intervalles.

Terminologie

La quantité

$$\left(\int_a^b f(t)^p dt \right)^{1/p}$$

est appelée la «norme p », et le résultat de cet exercice justifie que l'on parle de «norme infinie» M_∞ lorsque $p \rightarrow +\infty$ des normes p .

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.13

Si $\int_a^b g(t) dt = 0$, puisque g est continue et positive, c'est la fonction nulle. Et donc tout $c \in [a, b]$ convient.

On suppose donc que l'intégrale de g est non nulle.

La fonction f est continue sur le segment $[a, b]$, donc par le théorème des bornes atteintes, elle possède un minimum m et un maximum M sur $[a, b]$.

Et alors¹³, pour tout $t \in [a, b]$, $mg(t) \leq f(t)g(t) \leq Mg(t)$.

Donc par croissance de l'intégrale,

$$m \int_a^b g(t) dt \leq \int_a^b f(t)g(t) dt \leq M \int_a^b g(t) dt.$$

$$\text{Et donc } m \leq \frac{\int_a^b f(t)g(t) dt}{\int_a^b g(t) dt} \leq M.$$

Or m et M sont des valeurs atteintes¹⁴ donc par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x \in [a, b]$ tel que

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(t)g(t) dt}{\int_a^b g(t) dt} \Leftrightarrow \int_a^b f(t)g(t) dt = f(c) \int_a^b g(t) dt.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.14

1. Puisque f est $\mathcal{C}^2$, il en est de même de $f - \varphi$, et donc F est de classe $\mathcal{C}^3$. Par la formule de Taylor avec reste intégral, on a donc pour tout $x \in [a, b]$,

$$F(x) = F(c) + F'(c)(x - c) + F''(c)(x - c) + \int_c^x F^{(3)}(t) \frac{(x - t)^2}{2} dt.$$

Mais $F'(c) = f(c) - \varphi(c) = 0$, et $F''(c) = f'(c) - \varphi'(c) = f'(c) - f'(c) = 0$.

Enfin, $F^{(3)} = f''' - \varphi''$, et φ étant affine¹⁵, sa dérivée seconde est nulle.

On a donc bien la formule annoncée.

2. On a

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) dt - (b - a)f(c) &= \int_a^b f(t) dt - \int_a^b \varphi(t) dt \\ &= \int_a^b (f - \varphi)(t) dt = F(b) - F(a) \\ &= \int_c^b \frac{(b - t)^2}{2} f''(t) dt - \int_c^a \frac{(a - t)^2}{2} f''(t) dt. \end{aligned}$$

Mais on a

$$\left| \int_c^b \frac{(b - t)^2}{2} f''(t) dt \right| \leq \int_c^b \|f''\|_\infty \frac{(b - t)^2}{2} dt \leq \|f''\|_\infty \left[-\frac{(b - t)^3}{6} \right]_c^b \leq \|f''\|_\infty \frac{(b - a)^3}{48}.$$

$$\text{Et de même, } \left| \int_c^a \frac{(a - t)^2}{2} f''(t) dt \right| \leq \frac{(b - a)^3}{48} \|f''\|_\infty.$$

Et donc par inégalité triangulaire,

$$\left| \int_a^b f(t) dt - (b - a)f\left(\frac{a + b}{2}\right) \right| \leq \left| \int_c^b \frac{(b - t)^2}{2} f''(t) dt \right| + \left| \int_c^a \frac{(a - t)^2}{2} f''(t) dt \right| \leq \|f''\|_\infty \frac{(b - a)^3}{24}.$$

3. L'énoncé est un peu vague, et par méthode du point milieu, j'entends les sommes de Riemann associées à une subdivision pointée dont la subdivision est régulière, et où dans chaque petit intervalle on approche f par la valeur qu'elle prend au point milieu de l'intervalle. Il s'agit juste de noter que si $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ est la subdivision régulière de

¹³ Et là la positivité de g est indispensable.

¹⁴ Et pas seulement des mineurs/majorants de f .

¹⁵ C'est-à-dire polynomiale de degré 1.

FIGURE 31.2— Pour une fonction affine, son intégrale sur un segment $[a, b]$ est égale à sa valeur en $\frac{a+b}{2}$ fois la longueur du segment. Si ceci peut se vérifier par le calcul, on le comprend bien graphiquement.

pas $\frac{b-a}{n}$, c'est-à-dire avec $x_k = a + k\frac{b-a}{n}$, alors l'inégalité précédente vaut sur chacun des $[x_k, x_{k+1}]$ et donc

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t) dt - \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right) \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \left(\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt - (x_{k+1} - x_k) f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right) \right) \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt - (x_{k+1} - x_k) f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right) \right| && \text{Inégalité triangulaire.} \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(x_{k+1} - x_k)^3}{24} \|f''\|_\infty \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(b-a)^3}{24n^3} \|f''\|_\infty \leq \frac{(b-a)^3}{24n^2} \|f''\|_\infty. \end{aligned}$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.15

- Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, alors on peut procéder à une intégration par parties : pour tout $n \in \mathbf{N}^*$,

$$\int_a^b f(t) \cos(nt) dt = \left[-f(t) \frac{\sin(nt)}{n} \right]_a^b - \frac{1}{n} \int_a^b f'(t) \sin(nt) dt = \frac{f(a) \sin(na) - f(b) \sin(nb)}{n} - \frac{1}{n} \int_a^b f'(t) \sin(nt) dt.$$

Il est clair que $\frac{f(a) \sin(na) - f(b) \sin(nb)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, et par ailleurs, puisque f' est continue sur $[a, b]$, elle y est bornée.

Notons M un majorant de $|f'|$ sur $[a, b]$. Alors

$$\left| \int_a^b f'(t) \sin(nt) dt \right| \leq \int_a^b |f'(t) \sin(nt)| dt \leq \int_a^b M dt \leq M(b-a).$$

Et donc en particulier, $\frac{1}{n} \int_a^b f'(t) \sin(nt) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On en déduit donc bien le résultat annoncé, à savoir que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0$.

- Commençons par le cas très particulier d'une fonction constante égale à λ : on a alors

$$\int_a^b \lambda \cos(nt) dt = \underbrace{\frac{\lambda}{n}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \underbrace{(\sin(nb) - \sin(na))}_{\text{borné}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Dans le cas d'une fonction en escalier f , notons $x_0 < x_1 < \dots < x_k$ une subdivision adaptée à f , et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ les réels tels que $\forall t \in]x_{i-1}, x_i[$, $f(t) = \lambda_i$.

On a alors pour tout $n \in \mathbf{N}$, $\int_a^b f(t) \cos(nt) dt = \sum_{i=1}^k \int_{x_{i-1}}^{x_i} \lambda_i \cos(nt) dt$.

Or nous venons de prouver que chacune de ces intégrales tend vers 0, donc par somme de limites, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \cos(nt) dt = 0$.

- Soit $\varepsilon > 0$. Alors il existe φ une fonction en escaliers telle que $\|f - \varphi\|_\infty \leq \varepsilon$. On a alors, pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) \cos(nt) dt &= \int_a^b (\varphi(t) + f(t) - \varphi(t)) \cos(nt) dt \\ &= \int_a^b \varphi(t) \cos(nt) dt + \int_a^b (f(t) - \varphi(t)) \cos(nt) dt. \end{aligned}$$

Nous savons déjà, par la deuxième question, que la première intégrale est de limite nulle.

En particulier, il existe $n_0 \in \mathbf{N}$ tel que pour $n \geq n_0$, $\left| \int_a^b \varphi(t) \cos(nt) dt \right| \leq \varepsilon$.

Remarque
Les valeurs de f aux x_i n'ayant aucune incidence sur la suite, nous ne prenons pas la peine de les nommer.

Rappel
Cela signifie tout simplement que pour tout $t \in [a, b]$,
 $|f(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon$.

Par ailleurs, par inégalité triangulaire,

$$\left| \int_a^b (f(t) - \varphi(t)) \cos(nt) dt \right| \leq \int_a^b \varepsilon dt \leq (b-a)\varepsilon.$$

Et donc pour $n \geq n_0$, $\left| \int_a^b f(t) \cos(nt) dt \right| \leq (b-a+1)\varepsilon$.

Et donc on a bien prouvé que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \cos(nt) dt = 0$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.16

- Supposons par l'absurde que f ne s'annule pas. Alors, étant continue, elle est de signe constant¹⁶. Or l'intégrale d'une fonction continue de signe constant est nulle si et seulement si il s'agit de la fonction nulle, ce qui est absurde ici. Donc f s'annule au moins une fois.
- Comme indiqué, procédons par l'absurde en supposant que f s'annule au plus n fois, en $x_1 < x_2 < \dots < x_p$, avec $p \leq n$. Alors f est de signe constant sur chacun des $]x_i, x_{i+1}[$. Quitte à enlever certains des x_i , supposons que f change de signe en chacun des x_i : le signe de f sur $]x_i, x_{i+1}[$ est l'opposé de celui du signe de f sur $]x_{i-1}, x_i[$ (avec également un changement de signe en x_1 et en x_p s'ils s'ont différents de a et b).

Considérons alors la fonction polynomiale $Q : x \mapsto \prod_{k=1}^p (x - x_k)$.

Elle ne s'annule qu'en les x_i , et change de signe en tous les x_i , car ceux-ci sont de multiplicité 1.

Et donc $t \mapsto f(t)Q(t)$ est une fonction continue de signe constant, et donc son intégrale entre a et b est non nulle, du signe de $f(t)Q(t)$.

Mais par ailleurs, Q étant polynomiale de degré $p \leq n$, il existe des réels $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que $\forall t \in [a, b], Q(t) = \sum_{k=0}^n \lambda_k t^k$.

Et donc $\int_a^b f(t)Q(t) dt = \sum_{k=0}^n \lambda_k \int_a^b t^k f(t) dt = 0$, ce qui est absurde.

Donc f s'annule au moins $n+1$ fois sur $[a, b]$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.17

Soit $F : x \mapsto \int_0^x f(t) dt$, qui par le théorème fondamental de l'analyse, est une primitive de f , et en particulier est de classe $\mathcal{C}^1$ puisque sa dérivée f est continue.

Alors par la relation de Chasles, $g(x) = F(x^2) - F(2x)$.

Par opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, il s'agit là d'une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}$, et sa dérivée est donnée par

$$g'(x) = 2xf(x^2) - 2f(2x).$$

Pour h , on ne peut s'en tirer directement de la même manière en raison de la présence du x à l'intérieur de l'intégrale.

En revanche, en commençant par un changement de variable affine, on a

$$h(x) = \int_x^{2x} f(u) du.$$

Et cette fois le même raisonnement s'applique, $h(x) = F(2x) - F(x)$, est de classe $\mathcal{C}^1$, avec $h'(x) = 2f(2x) - f(x)$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.18

Notons $G(x) = \frac{1}{2} \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2$.

Alors G est une fonction continue sur $\mathbf{R}$, dérivable, et de dérivée égale à g .

Remarque

Vous êtes grands maintenant, je n'explique plus pourquoi être inférieur à $(b-a+1)\varepsilon$ (alors que la définition de limite demande du ε) suffit. Assurez-vous tout de même que c'est clair pour vous, et sinon, demandez !

¹⁶ Rappelons qu'il s'agit là d'une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires.

Détails

Un polynôme change de signe en une racine réelle α si et seulement si la multiplicité de α est impaire.

Notons qu'on a alors $g(0) = G(0) = 0$.

Supposons que g soit décroissante sur $\mathbf{R}$. Alors, pour $x \geq 0$, on a $g(x) \leq 0$, et donc G est décroissante sur $\mathbf{R}^+$. Or, $G(0) = 0$, donc $G(x) \leq 0$ pour $x \in \mathbf{R}_+$. Or, G est positive par définition, donc $G(x) = 0, \forall x \in \mathbf{R}_+$.

On en déduit que $\forall x \in \mathbf{R}_+, \int_0^x f(t) dt = 0$, et par dérivation¹⁷, il vient $f(x) = 0, \forall x \in \mathbf{R}_+$, puis $f(0) = 0$ par continuité de f .

La même étude sur $\mathbf{R}_-$ permet d'arriver à la même conclusion, car on aura alors G croissante sur $\mathbf{R}_-$, avec $G(0) = 0$, donc $G = 0$ sur $\mathbf{R}_-$, et donc $f = 0$ sur $\mathbf{R}_-$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.19

Notons $F(x) = \int_0^x tf(t) dt$. Alors $F(0) = 0$, et par le théorème fondamental de l'analyse,

F est une primitive de $x \mapsto xf(x)$ sur $] -1, 1[$.

Puisque f est continue, elle possède un développement limité d'ordre 0 en 0 :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{=} f(0) + o(1).$$

Et donc $xf(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{=} f(0)x + o(x)$.

Mais par intégration de développement limité, $F(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} F(0) + \frac{f(0)}{2}x^2 + o(x^2)$.

Puisque $F(0) = 0$, on a donc $\frac{F(x)}{x^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{f(0)}{2} + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{f(0)}{2}$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.20

1. La linéarité ne pose pas de difficultés, mais il ne faut pas oublier de vérifier que $T(f)$ est bien un élément de $\mathcal{C}^0(\mathbf{R})$.

Mais par le théorème fondamental de l'analyse, $x \mapsto \int_0^x f(t) dt$ est une primitive de f , et à ce titre est dérivable, donc continue.

Puisque $x \mapsto x$ est encore continue, $T(f)$ est continue par produit de fonctions qui le sont.

2. Soit $f \in \text{Ker } T$. Alors pour tout $x \in \mathbf{R}$, $x \int_0^x f(t) dt = 0$.

Et en particulier, pour tout $x \neq 0$, $\int_0^x f(t) dt = 0$.

En particulier, en dérivant, la fonction $x \mapsto f(x)$ est nulle sur $\mathbf{R}^*$.

Étant continue en 0, elle est également nulle en 0, et donc $f = 0$, si bien que f est injective.

Le raisonnement tenu à la question 1 prouve que pour tout $f \in \mathcal{C}^0(\mathbf{R})$, $T(f)$ est dérivable. Et donc si g est une fonction continue sur $\mathbf{R}$ et non dérivable¹⁸, alors g ne possède pas d'antécédent par T , et donc T n'est pas surjective.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.21

1. Par la relation de Chasles, on a

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x \min(x, t)f(t) dt + \int_x^1 \min(x, t)f(t) dt = \int_0^x tf(t) dt + \int_x^1 xf(t) dt \\ &= \int_0^x tf(t) dt + x \int_x^1 f(t) dt. \end{aligned}$$

Mais par le théorème fondamental de l'analyse, $x \mapsto \int_0^x tf(t) dt$ est une primitive¹⁹. de $x \mapsto xf(x)$.

On prouve de même que $x \mapsto \int_x^1 f(t) dt = - \int_1^x f(t) dt$ est une primitive de $-f$.

Donc déjà F est $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ et

$$F'(x) = xf(x) - xf(x) + \int_x^1 f(t) dt = \int_x^1 f(t) dt.$$

Et donc par ce qui a été dit précédemment, F' est $\mathcal{C}^1$, et donc F est $\mathcal{C}^2$, avec $F''(x) = -f$.

¹⁷ C'est encore et toujours du théorème fondamental de l'analyse.

Rappel
Un endomorphisme a , par définition, mêmes espaces de départ et d'arrivée.

¹⁸ Par exemple la fonction $x \mapsto |x|$

¹⁹ Nécessairement $\mathcal{C}^1$

2. On a $F(0) = \int_0^1 \min(0, t)f(t) dt = \int_0^1 0 dt = 0$.

Et donc

$$F(x) = F(0) + \int_0^x F'(u) du = \int_0^x \left(\int_u^1 f(t) dt \right) du.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.22

1. Fixons $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, et soit $f_t : x \mapsto \sqrt{x + \cos t}$.

Alors f_t est $\mathcal{C}^2$ sur $]1, +\infty[$, avec $f_t'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x + \cos t}}$ et $f_t''(x) = -\frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt{x + \cos t}^3}$.

En particulier, pour $h \in \left[\frac{1-x_0}{2}, \frac{x_0-1}{2} \right]$, alors $x_0 + h \geq \frac{1+x_0}{2}$, et un majorant de $|f''|$ sur $\left[\frac{1+x_0}{2}, +\infty \right]$ est

$$M = \frac{1}{4} \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{1+x_0}{2} + \cos t} \right)^3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{(\sqrt{1+x_0+2\cos t})^3}.$$

Et donc par l'inégalité de Taylor-Lagrange appliquée en x_0 ,

$$|f_t(x_0 + h) - f_t(x_0) - hf_t'(x_0)| \leq \frac{|x_0 + h - x_0|^2}{2} M$$

soit encore

$$\left| \sqrt{x_0 + h + \cos t} - \sqrt{x_0 + \cos t} - \frac{h}{2\sqrt{x_0 + \cos t}} \right| \leq \frac{h^2}{2\sqrt{2}} \frac{1}{(\sqrt{1+x_0+2\cos t})^3}.$$

2. Pour prouver que F est dérivable, revenons au taux d'accroissement : soit $x_0 > 1$ fixé, et soit $h \in \left[\frac{1-x_0}{2}, \frac{x_0-1}{2} \right]$. Alors

$$\begin{aligned} \left| F(x_0 + h) - F(x_0) - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{h}{2\sqrt{x_0 + \cos t}} dt \right| &\leq \int_0^{\pi/2} \left| \sqrt{x_0 + h + \cos t} - \sqrt{x_0 + \cos t} - \frac{h}{2\sqrt{x_0 + \cos t}} \right| dt \\ &\leq \int_0^{\pi/2} \frac{h^2}{2\sqrt{2}} \frac{dt}{(\sqrt{1+x_0+2\cos t})^3}. \end{aligned}$$

Et donc après division par $|h|$ pour $h \neq 0$, il reste

$$\left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{2\sqrt{x_0 + \cos t}} \right| \leq \frac{h}{2\sqrt{2}} \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{(\sqrt{x_0 + 1 + 2\cos t})^3}.$$

Notons que cette dernière intégrale ne dépend pas de h , donc lorsque $h \rightarrow 0$, il vient donc,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{2\sqrt{x_0 + \cos t}}.$$

Donc F est dérivable en x_0 , et $F'(x_0) = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{2\sqrt{x_0 + \cos t}}$.

Et ceci étant vrai pour tout $x_0 \in]1, +\infty[$, on arrive bien à la conclusion annoncée par l'énoncé.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.23

Notons qu'il s'agit de déterminer si la courbe représentative de $\sin$ est située au dessus ou en dessous des courbes représentatives de ses développements limités d'ordre 3 et 5 en 0.

Les dérivées successives de $\sin$ sont données par $\sin' = \cos$, $\sin'' = -\sin$, $\sin^{(3)} = -\cos$, $\sin^{(4)} = \sin$, etc.

Et donc à l'ordre 3, on a, par la formule de Taylor avec reste intégral²⁰

$$\sin(x) - \left(x - \frac{x^3}{6} \right) = \int_0^x \sin^{(4)}(t) \frac{(x-t)^3}{3!} dt = \int_0^x \sin(t) \frac{(x-t)^3}{3!} dt.$$

²⁰ Valable puisque le $\sin$ est une fonction $\mathcal{C}^\infty$.

Mais pour $x \in [0, \pi]$ et $t \in [0, x]$, $\sin(t) \frac{(x-t)^3}{3!} \geq 0$, donc par croissance de l'intégrale,
 $\sin(x) - \left(x - \frac{x^3}{6}\right) \geq 0$.

À l'ordre 5, on a en revanche, $\sin(x) - \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right) = \int_0^x \sin^{(6)}(t) \frac{(x-t)^5}{5!} dt =$
 $-\int_0^x \sin(t) \frac{(x-t)^5}{5!} dt$ qui est cette fois négatif.

Et donc $\sin(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.24

Notons $f(t) = e^t$, qui est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Soit $x \in \mathbf{R}$. Par l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 1 appliquée entre 0 et x , si on note I le segment d'extrémités 0 et x et $M = \max_{t \in I} |f''(t)|$, il vient

$$|f(x) - f(0) - f'(0)x| \leq \frac{x^2}{2}M \Leftrightarrow |e^x - 1 - x| \leq \frac{x^2}{2}M.$$

Si $x \geq 0$, on a $M = e^x = e^{|x|}$, et donc l'inégalité souhaitée est démontrée.

Et si $x \leq 0$, alors le maximum de $f^{(2)}$ sur le segment $[x, 0]$ est $e^0 = 1$, et donc $M = 1 \leq e^{|x|}$, de sorte que

$$\forall x \in \mathbf{R}, |e^x - 1 - x| \leq \frac{x^2}{2}e^{|x|}.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.25

Vous aurez bien évidemment reconnu que $\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$ est le $DL_{2n}(0)$ du cosinus.

Il s'agit donc de prouver que la différence entre $\cos(x)$ et ce développement limité tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$.

Or, par l'inégalité de Taylor-Lagrange, qui s'applique puisque $\cos$ est de classe $\mathcal{C}^{2n+1}$ pour tout n , on a, pour $x \in \mathbf{R}$ et $n \in \mathbf{N}$,

$$\left| \cos(x) - \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \right| \leq \sup_{t \in \mathbf{R}} |\cos^{2n+1}(t)| \frac{|x|^{2n}}{(2n)!} \leq \frac{|x|^{2n}}{(2n)!}.$$

Mais par croissances comparées, ce majorant tend vers 0, et donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(x) - \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 0 \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \cos(x).$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.26

Puisque f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, on peut utiliser l'inégalité de Taylor-Lagrange à tout ordre.

Soit donc $x \in]-\frac{1}{A}, \frac{1}{A}[$. Alors pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$\left| f(x) - \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k}_{=0} \right| \leq \frac{|x|^{n+1} A^{n+1} (n+1)!}{(n+1)!} \leq (|x|A)^{n+1}.$$

Mais puisque $|x| < \frac{1}{A}$, la suite géométrique de raison $|x|A$ tend vers 0, et donc par passage à la limite, $|f(x)| = 0$, si bien que $f(x) = 0$.

Donc f est nulle sur $]-\frac{1}{A}, \frac{1}{A}[$.

La fonction f étant de classe $\mathcal{C}^\infty$, puisque toutes les $f^{(n)}$ sont nulles sur $]-\frac{1}{A}, \frac{1}{A}[$ et continues en $\frac{1}{A}$, pour tout $n \in \mathbf{N}$, $f^{(n)}\left(\frac{1}{A}\right) = 0$.

Considérons alors la fonction $g : x \mapsto f\left(x + \frac{1}{A}\right)$.

Alors pour tout $n \in \mathbf{N}$, $g^{(n)}(0) = f^{(n)}\left(\frac{1}{A}\right) = 0$.

⚠ Danger !

Si $x \leq 0$, il ne s'agit pas réellement du segment $[0, x]$, mais plutôt du segment $[x, 0]$.

C'est l'une des subtilités de l'inégalité de Taylor-Lagrange, il faut prendre pour M un majorant de $f^{(n+1)}$ entre 0 et x .

Et de plus, comme $g^{(n)}(x) = f^{(n)}\left(x + \frac{1}{A}\right)$, $\sup_{\mathbf{R}} |g^{(n)}| = \sup_{\mathbf{R}} |f^{(n)}| \leq A^n n!$.

Donc par ce qui a été dit précédemment, g est nulle sur $]-\frac{1}{A}, \frac{1}{A}[$, et par conséquent, f est nulle sur $]0, \frac{2}{A}[$.

De proche en proche on prouve ainsi que f est nulle sur tous les $]\frac{n}{A}, \frac{n+2}{A}[$. Et donc qu'elle est nulle sur $\mathbf{R}^+$.

Et de même, à l'aide de $x \mapsto f\left(x - \frac{1}{A}\right)$, on prouverait que f est nulle sur $]-\frac{2}{A}, 0[$, puis de proche en proche, sur $\mathbf{R}^-$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.27

Puisqu'on a un produit, commençons par passer au logarithme pour faire apparaître une somme :

$$\ln(u_n) = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right).$$

Il y a toutefois un hic : ceci n'est possible que si tous les $1 + \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ sont positifs.

Mais puisque f est continue sur $[0, 1]$, par le théorème des bornes atteintes, il existe $M \in \mathbf{R}_+$ tel que pour tout $t \in [0, 1]$, $|f(t)| \leq M$.

Et donc pour $n > M$ et tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\left|\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right| \leq \frac{1}{n}M < 1$.

Et donc tous les $1 + \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ sont positifs.

Donc dans la suite on ne considère que n suffisamment grand pour que ce qui précède soit vrai²¹, et on a alors

$$\ln(u_n) = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right).$$

Il s'agit donc de prouver que ceci tend vers $\int_0^1 f(t) dt$.

On ne reconnaît pas directement une somme de Riemann, mais lorsque n est grand, $\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ doit être petit, et puisque $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$, on doit avoir $\ln\left(1 + \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right) \approx \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$. Toutefois, on ne peut pas sommer les équivalents...

Utilisons plutôt l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 1 : pour tout $x \in [0, 1]$, $|f(x)| \leq M$.

Alors la fonction $g : x \mapsto \ln(1+x)$ est $\mathcal{C}^2$ sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, avec $g'(x) = \frac{1}{1+x}$ et $g''(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}$.
Donc pour tout $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$,

$$\underbrace{|g(x) - g(0) - g'(0)x|}_{=\ln(1+x)-x} \leq \frac{(x-0)^2}{2!} \underbrace{\max_{-1/2 \leq t \leq 1/2} \frac{1}{(1+t)^2}}_{=4} \leq 2x^2.$$

Donc en particulier, pour n assez grand (pour que $\frac{M}{n} \leq \frac{1}{2}$), et pour $1 \leq k \leq n$,

$$\left|\ln\left(1 + \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right) - \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right| \leq 2\frac{1}{n^2}f\left(\frac{k}{n}\right)^2 \leq \frac{2M^2}{n^2}.$$

Et donc par inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned} \left|\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right| &\leq \sum_{k=1}^n \left|\ln\left(1 + \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right) - \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \frac{2M^2}{n^2} \\ &\leq \frac{2M^2}{n} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

Autrement dit

Notre passage au logarithme ne vaut que pour les n suffisamment grand, mais par indifférence des premiers termes, ceci suffit pour déterminer la limite.

²¹ C'est-à-dire $n > M$.

Méthode

Si on souhaite utiliser une formule de Taylor ici, c'est tout simplement car on souhaite «contrôler» (en l'occurrence ici majorer) l'écart entre $\ln(1+x)$ et son développement limité à l'ordre 1 (qui est x).
C'est précisément ce à quoi servent les formules de Taylor.

Remarque

On a alors

$$\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right) \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

On a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = 0$.

Par ailleurs, on sait que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) dt$. Donc par somme,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) + v_n = \int_0^1 f(t) dt.$$

Enfin, par continuité de l'exponentielle,

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp\left(\int_0^1 f(t) dt\right).$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.28

1. On a $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$.

On reconnaît alors des sommes de Riemann pour la fonction²² $x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$ entre 0 et 1.

²² Continue.

Et donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t}{1+t^2} dt = \left[\frac{1}{2} \ln(1+t^2)\right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}$.

2. On a directement une somme de Riemann, pour la fonction $x \mapsto \cos^2(\pi x)$, entre 0 et 1. Et donc

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \cos^2(\pi t) dt = \int_0^1 \frac{1 + \cos(2\pi t)}{2} dt = \frac{1}{2}.$$

3. On a $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{k}{n}+1} = \frac{e^2}{n} + v_n$, où $v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{1+\frac{k}{n}}$.

On reconnaît là une somme de Riemann, de sorte que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \int_0^1 e^{1+t} dt = e^2 - e.$$

Puisque $\frac{e^2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = e^2 - e$.

4. On a $u_n = \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)}$ et donc

$$\ln u_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{i}{n}\right).$$

On reconnaît alors une somme de Riemann, qui converge vers

$$\int_0^1 \ln(1+x) dx = \left[(1+x) \ln(1+x) - (1+x)\right]_0^1 = 2 \ln 2 - 1.$$

Et alors, par continuité de l'exponentielle, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^{2 \ln 2 - 1} = \frac{4}{e}$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.29

On a

$$u_n = \sum_{k=1}^{n-1} \sqrt{k} \sqrt{n-k} = \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{k} \sqrt{n-k} = n^2 \times \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{\frac{k}{n}} \sqrt{1 - \frac{k}{n}}$$

On reconnaît alors une somme de Riemann : en posant $f : x \mapsto \sqrt{x} \sqrt{1-x}$, qui est

continue sur $[0, 1]$, on a $\frac{u_n}{n^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(t) dt$.

Calculons donc cette intégrale :

$$\int_0^1 \sqrt{x(1-x)} dx = \int_0^1 \sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2} dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{4} - u^2} du$$

Mise sous forme canonique suivie d'un changement de variable.

$$= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{4} - u^2} du = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 - (2u)^2} du.$$

Intégrale d'une fonction paire.

Posons alors $v = 2u$, de sorte que $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{1 - v^2} dv$. Le changement de variable $v = \sin t$ donne alors

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(2t) + 1) dt = \frac{\pi}{8}.$$

On en déduit que $\frac{u_n}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{8}$ et donc $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi n^2}{8}$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.30

Puisque nous avons un produit, préférons passer au logarithme : $\ln(u_n) = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)$.

Et donc $\frac{1}{n} \ln(u_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)$ est une somme de Riemann pour la fonction $f : x \mapsto \ln(1 + x^2)$,

continue sur $[0, 1]$.

$$\text{Donc } \frac{1}{n} \ln(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \ln(1 + x^2) dx.$$

Ne calculons pas cette intégrale, mais contentons-nous de remarquer qu'elle est strictement positive, car intégrale d'une fonction continue positive et non nulle²³.

²³ f s'annule uniquement en 0.

$$\text{Et donc } \ln(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \int_0^1 \ln(1 + x^2) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Par conséquent, en passant à l'exponentielle, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.31

$$\text{On a } S_n = \sqrt{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = n \sqrt{\frac{1}{n}} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}.$$

On reconnaît alors que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$ est une somme de Riemann pour la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ entre 0 et 1.

$$\text{Donc } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sqrt{t} dt = \left[\frac{2}{3} t^{3/2} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Et donc } S_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{3} n \sqrt{n}.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.32

$$\text{On a } u_n = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{2}{n}} + \dots + \frac{1}{1 + \frac{n}{n}} \right).$$

On reconnaît alors une somme de Riemann associée à la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ entre 0 et 1.

$$\text{Donc } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln(2).$$

Notons $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, de sorte que $u_n = v_{2n} - v_n$.

Il est assez clair que (v_n) est croissante, et donc soit convergente, soit de limite égale à $+\infty$. Si elle était convergente de limite ℓ , alors on aurait $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell - \ell = 0$, ce qui n'est pas le cas.

$$\text{Donc } v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.33

Cette intégrale (notons la $I(a)$ dans la suite) est bien définie lorsque $x \mapsto a^2 - 2a \cos(x) + 1$ est strictement positif sur $[0, \pi]$.

Pour $x \in [0, \pi]$, notons $P_x : a \mapsto a^2 - 2a \cos(x) + 1$ qui est un polynôme du second degré en a . Son discriminant est $\Delta_x = 4 \cos^2(x) - 4 = 4(\cos^2(x) - 1)$, qui est négatif, de sorte que P_x est de signe constant. Et puisque son coefficient dominant est positif, il est positif. Mieux : Δ_x est strictement négatif, et donc P_x ne s'annule pas, sauf pour $x = 0$ et $x = \pi$,

Remarque
Le résultat se généralise sans difficulté à $\sum_{k=1}^n k^\alpha$, avec $\alpha > 0$. Nous verrons d'autres moyens de le retrouver lorsque nous rencontrerons une méthode nommée «comparaison série/intégrale».

auquel cas P_x possède une unique racine, qui est 1 (lorsque $x = 0$) ou -1 (lorsque $x = \pi$).
Donc l'intégrale $I(a)$ existe dès que $a \neq \pm 1$.

On a alors

$$I(a) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left(a^2 - 2a \cos \left(\frac{k\pi}{n} \right) + 1 \right) = \frac{\pi}{n} \ln \left(\prod_{k=0}^{n-1} \left(a^2 - 2a \cos \left(\frac{k\pi}{n} \right) + 1 \right) \right).$$

Or les racines complexes du polynôme (en a) $a^2 - 2a \cos \left(\frac{k\pi}{n} \right) + 1$ sont $e^{i\frac{k\pi}{n}}$ et $e^{-i\frac{k\pi}{n}}$.

Et donc

$$\prod_{k=0}^{n-1} \left(a^2 - 2a \cos \left(\frac{k\pi}{n} \right) + 1 \right) = \prod_{k=0}^{n-1} \left(a - e^{i\frac{k\pi}{n}} \right) \left(a - e^{-i\frac{k\pi}{n}} \right).$$

Il s'agit donc d'un polynôme de degré $2n$, qui possède 1 comme racine double²⁴ et dont les autres racines, toutes de multiplicité 1, sont les $e^{i\frac{k\pi}{n}}$ et $e^{-i\frac{k\pi}{n}}$, pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

On reconnaît alors toutes les racines $2n^{\text{èmes}}$ de l'unité, à l'exception de -1 .

D'autre part, nous savons que

$$\prod_{\zeta \in \mathbf{U}_{2n}} (a - \zeta) = a^{2n} - 1.$$

Et donc puisque $a \neq \pm 1$,

$$\prod_{k=0}^{n-1} \left(a^2 - 2a \cos \left(\frac{k\pi}{n} \right) + 1 \right) = \frac{a-1}{a+1} \prod_{\zeta \in \mathbf{U}_{2n}} (a - \zeta) = \frac{a-1}{a+1} (a^{2n} - 1).$$

Et donc

$$I(a) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} \ln \left(\frac{a-1}{a+1} (a^{2n} - 1) \right).$$

Donc déjà, si $|a| < 1$, $a^{2n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et donc $\frac{a-1}{a+1} (a^{2n} - 1) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \frac{1-a}{a+1} > 0$ et donc $I(a) = 0$.

En revanche, si $|a| > 1$, alors $a^{2n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ et alors

$$\ln(a^{2n} - 1) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(a^{2n}) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \ln(a^2).$$

Puisque par ailleurs, $\ln \left(\frac{a-1}{a+1} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n \ln(a^2))$, on a

$$\ln \left(\frac{a-1}{a+1} (a^{2n} - 1) \right) = \ln \left(\frac{a-1}{a+1} \right) + \ln(a^{2n} - 1) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \ln(a^2).$$

Et donc

$$I(a) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} \ln \left(\frac{a-1}{a+1} (a^{2n} - 1) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} \ln(a^{2n} - 1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} n \ln(a^2) = \pi \ln(a^2).$$

Au final, on a donc prouvé que

$$\int_0^\pi \ln(a^2 - 2a \cos(x) + 1) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } |a| < 1 \\ \pi \ln(a^2) & \text{si } |a| > 1 \end{cases}$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 31.34

1. Soit $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ l'unique primitive de f qui s'annule en a .

Il s'agit bien évidemment d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ puisque f est continue.

Et puisque f est à valeurs strictement positives, $F' = f > 0$, et donc F est strictement croissante.

Puisque $F(b) = \int_a^b f(t) dt$, que $F(a) = 0$, et que

$$0 \leq \frac{1}{n} \int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b f(t) dt$$

²⁴ C'est le cas $k = 0$.

Remarque

Notons que l'existence de ces limites est automatique, puisque nous sommes partis de sommes de Riemann, qui possèdent nécessairement une limite.

Rappel

Si $u_n \sim v_n$ et $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$, alors $\ln(u_n) \sim \ln(v_n)$.

par le théorème de la bijection, il existe un unique $x_1 \in [a, b]$ tel que

$$F(x_1) = \frac{1}{n} \int_a^b f(t) dt \Leftrightarrow \int_a^{x_1} f(t) dt = \frac{1}{n} \int_a^b f(t) dt.$$

Puis de même, il existe un unique $x_2 \in [x_1, b]$ tel que

$$F(x_2) = \frac{2}{n} \int_a^b f(t) dt \Leftrightarrow \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt = \frac{1}{n} \int_a^b f(t) dt.$$

De proche en proche, on prouve ainsi, que pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, il existe un unique x_k tel que $\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt = \frac{1}{n} \int_a^b f(t) dt$.

2. Notons $A = \int_a^b f(t) dt$.

La question précédente nous indique que $x_k = F^{-1}\left(\frac{k}{n}A\right)$.

Et donc $f(x_k) = f\left(F^{-1}\left(\frac{k}{n}A\right)\right)$.

Par conséquent,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (f \circ F^{-1})\left(\frac{k}{n}A\right).$$

On reconnaît alors, à une constante multiplicative près²⁵, des sommes de Riemann pour la fonction $f \circ F^{-1}$, entre 0 et A.

Plus précisément, il vient, puisque $f \circ F^{-1}$ est continue

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) = \frac{1}{A} \frac{A}{n} \sum_{k=1}^n (f \circ F^{-1})\left(\frac{k}{n}A\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{A} \int_0^A (f \circ F^{-1})(t) dt.$$

Nous pourrions nous arrêter ici, mais avec le changement de variable $x = F^{-1}(t)$, légitime car F^{-1} est $\mathcal{C}^1$ il vient

$$\int_0^A (f \circ F^{-1})(t) dt = \int_a^b f(x) f'(x) dx = \int_a^b f^2(x) dx.$$

Et donc

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^b f^2(t) dt}{\int_a^b f(t) dt}.$$

²⁵ Le fameux $\frac{b-a}{n}$ devant la somme de Riemann.

Détails

F est $\mathcal{C}^1$ et strictement croissante, avec une dérivée (f) qui ne s'annule pas, donc F^{-1} est également $\mathcal{C}^1$.